

Nom et prénom de l'élève :

PROTOCOLE D'URGENCE EN CAS DE CRISE OU MALAISE AIGU

Protocole rédigé et signé par le médecin traitant ou l'allergologue
(Un exemplaire doit être inséré dans la trousse d'urgence)

Date du bilan allergologique :

L'élève est allergique à (préciser le ou les allergènes en cause) :

En cas d'ingestion accidentelle d'un allergène, prendre l'avis du SAMU 15, sans attendre l'apparition des signes.

COMPOSITION DE LA TROUSSE D'URGENCE

--

CONDUITE A TENIR EN CAS DE CRISE

■ **Noter l'heure d'apparition des signes cliniques**

SIGNES D'APPEL	CONDUITE A TENIR ET/OU TRAITEMENT ET POSOLOGIE
Démangeaisons, boutons comme des piqûres d'orties, plaques rouges	
Yeux gonflés, éternuements, écoulements de nez	
Gonflement des lèvres, du visage ou d'une partie du corps	
Douleurs abdominales, vomissements	
Toux sèche, gêne respiratoire, sifflements audibles, l'enfant se plaint de ne pas pouvoir respirer correctement	
Toux rauque, voix modifiée, signes d'asphyxie, d'étouffement	
Malaise avec démangeaisons, gêne respiratoire, douleurs abdominales, nausées, vomissements, perte de connaissance	

■ **Appeler le SAMU 15**

- ▶ Informer de l'existence et du contenu du PAI
- ▶ Signaler ce qui a été fait, c'est-à-dire l'heure d'apparition des signes cliniques et les médicaments donnés. Suivre les instructions.
- ▶ Avertir ou faire avertir les parents de l'élève ou ses représentants légaux.
- ▶ Rester à côté de l'élève

Date

Signature et cachet du médecin

AMENAGEMENTS A METTRE EN OEUVRE

LOCALISATION DE LA TROUSSE D'URGENCE (spécifier un ou plusieurs emplacements)

Elle doit être accessible à tout moment et à toute personne en charge d'administrer le traitement d'urgence.
Elle doit comporter l'ordonnance détaillée pour les soins.
L'adrénaline auto-injectable peut être conservée à température ambiante n'excédant pas 25° pendant 18 mois.
Toutefois, lors des sorties scolaires en périodes chaudes, elle devra être mise dans un sac isotherme.

La famille fournit les traitements nécessaires et remplace les médicaments périmés.

PRISE ALIMENTAIRE

• REPAS

Panier repas seul autorisé

Si panier repas, celui-ci ne doit pas être déposé dans le même réfrigérateur que des médicaments. Modalités pour la prise du repas (maintien de la chaîne du froid, lieu du repas, surveillance...) :

Régime spécifique garanti par le distributeur de restauration collective

La famille s'engage à prévenir dès que possible de l'absence de l'élève en téléphonant au :

Menus proposés par la cantine avec éviction simple de l'agent allergisant faite :

Sous contrôle du personnel de cuisine

par l'élève



Dans ce cas, la responsabilité de l'établissement n'est pas engagée

• GOUTER

Modalités à préciser :

PENDANT LES COURS

Une attention particulière doit être portée lors de la manipulation de certains matériaux allergisants.

▶ Travaux manuels, ateliers de cuisine, éviter la manipulation de :

fruits à coques (amandes, noix, noisettes....)

arachides (cacahuètes)

pâte à modeler

pâte à sel

autres :

▶ Autres aménagements à préciser :

SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES

▶ Emporter la trousse d'urgence complète avec le PAI.

▶ L'adrénaline auto-injectable doit être conservée à température ambiante inférieure à 25°.

Lors des sorties scolaires en périodes chaudes, elle devra être mise dans un sac isotherme.

▶ Prendre un téléphone mobile et s'assurer de la couverture du réseau.

▶ La personne responsable de la sortie doit avertir la structure d'accueil de l'existence du PAI et s'assurer que les conditions d'accueil permettront d'appliquer les consignes contenues dans le document. Sinon, en informer la famille.