

Nom et prénom de l'élève :

PROTOCOLE D'URGENCE

Protocole rédigé et signé par le médecin traitant ou l'allergologue
(Un exemplaire doit être inséré dans la trousse d'urgence)

LISTE DU CONTENU DE LA TROUSSE D'URGENCE

CONDUITE A TENIR EN CAS DE CRISE

SYMPTOMES	CONDUITE A TENIR ET/OU TRAITEMENT ET POSOLOGIE
<ul style="list-style-type: none"> • Signes d'appel <li style="margin-left: 20px;">- Gêne respiratoire <li style="margin-left: 20px;">- Essoufflement <li style="margin-left: 20px;">- Irritation de la gorge <li style="margin-left: 20px;">- Oppression thoracique <li style="margin-left: 20px;">- Sifflements audibles <li style="margin-left: 20px;">- Pincement des narines 	<p>Mettre l'élève assis et au calme</p> <p>Donner le traitement :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Si les signes persistent après minutes, renouveler le traitement</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Signes de gravité <li style="margin-left: 20px;">- Angoisse <li style="margin-left: 20px;">- Difficultés pour parler <li style="margin-left: 20px;">- Sueurs <li style="margin-left: 20px;">- Agitation <li style="margin-left: 20px;">- Pâleurs <li style="margin-left: 20px;">- Lèvres bleues (cyanose) <li style="margin-left: 20px;">- Epuisement <li style="margin-left: 20px;">- Somnolence 	<p>Protocole détaillé :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Si pas d'amélioration ou aggravation 	<p>Appeler le SAMU 15</p> <p>Appeler la famille</p> <p>Rester près de l'élève</p>

Date

Signature et cachet du médecin

AMENAGEMENTS A METTRE EN OEUVRE

LOCALISATION DE LA TROUSSE D'URGENCE (spécifier clairement un ou plusieurs emplacements)

.....
.....

Elle doit être accessible à tout moment et à toute personne en charge d'administrer le traitement d'urgence.
Elle doit comporter l'ordonnance détaillée pour les soins.
L'ANAPEN peut être conservé à température ambiante n'excédant pas 25 ° pendant 18 mois. Toutefois, lors des sorties scolaires en périodes chaudes, il devra être mis dans un sac isotherme.

La famille fournit les traitements nécessaires et remplace les médicaments périmés.

MODALITES D'ADMINISTRATION DU FLACON AEROSOL

EN SPRAY

- Agiter le flacon aérosol de
- Introduire l'embout dans la bouche
- Expirer longuement
- Commencer une inspiration lente et profonde par la bouche appuyant sur l'aérosol, tout en continuant d'inspirer conformément à la notice.
- Retenir la respiration pendant 10 secondes
- Expirer normalement
- Recommencer aussitôt avec la seconde bouffée de produit
- Ne pas oublier d'emporter le traitement, en cas d'activité sportive ou extra-scolaire

AVEC UNE CHAMBRE D'INHALATION

- Secouer le flacon aérosol
- L'emboucher à la chambre d'inhalation
- Y pulvériser les doses ordonnées
 - ▶ L'élève respire dans la chambre d'inhalation
 - ▶ Bien vérifier que :
 - - Le masque englobe bien le nez et la bouche de l'élève
 - - Les clapets sont mobilisés par la respiration de l'élève
 - ▶ Respecter la prescription médicale